

## Patientenaufklärung zur Magenspiegelung (Ösophago-Gastro-Duodenoskopie)



Sehr verehrte Frau / Sehr geehrter Herr

---

wir bieten Ihnen am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr einen Termin zur Magenspiegelung in unserer Praxis, August-Bebel-Straße 18 in Heidenau, an.

Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, so bitten wir um Absage oder um Verlegung unter **03529-514423**.

Liebe Patientin, lieber Patient,  
im Rahmen der von Ihnen geäußerten Beschwerden und der weiteren diagnostischen Abklärung wird eine Magenspiegelung für erforderlich erachtet. Damit Sie sich entscheiden können, unterrichten wir Sie zunächst mit diesem Bogen, dem später ein Aufklärungsgespräch folgt.

### Die Vorbereitung

Voruntersuchungen oder eine spezielle Vorbereitung sind nicht notwendig. Nehmen Sie am Abend vorher nur eine leichte Mahlzeit ein und bleiben Sie dann nüchtern. Auf Wunsch verabreichen wir Ihnen ein Beruhigungsmittel (Midazolam®, Propofol®) in die Armvene, welches Sie in einen angenehmen Schlafzustand versetzt. In diesem Fall besteht für den gesamten Tag eine Fahruntüchtigkeit! Das Führen eines Fahrzeuges und das Bedienen von Maschinen ist an diesem Tag untersagt. **Wichtig:** organisieren Sie sich unbedingt eine Abholperson, die Sie sicher nach Hause begleitet! Ist dies nicht möglich, kann die Heimfahrt auch mit einem Taxi erfolgen. In diesem Fall ist das Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für diesen Tag möglich.

### Die Untersuchung

Vor der Untersuchung wird der Rachen lokal mit einem Anästhetikum betäubt. Lose Zahnprothesen müssen entfernt werden. Sie liegen in bequemer Linksseitenlage auf der Untersuchungsliege und bekommen zum Schutz unseres Gerätes einen Beißring in den Mund. Anschließend führen wir das flexible Instrument (Gastroskop) vorsichtig in die Speiseröhre, dann in den Magen und bis in den Zwölffingerdarm ein. Dabei kann der Arzt mit Hilfe der abwinkelbaren Spitze jede Ecke und Falte des Magens ausleuchten. Zur besseren Entfaltung des Magens wird Luft über einen Kanal am Gastroskop eingeblasen. Diese Luft wird beim Rückzug größtenteils wieder abgesaugt. Sie werden diese daher kaum bemerken. Durch Gewebeproben, die heute routinemäßig mit einer kleinen Biopsiezange entnommen werden, wird die Diagnose gesichert. Die Gewebeprobenentnahme ist für Sie völlig schmerzfrei und erfolgt über einen Kanal am Gerät.

## Mögliche Komplikationen

Trotz aller Sorgfalt kann es in seltenen Fällen zu Komplikationen kommen. Extrem selten ist eine Verletzung (Perforation) durch das Gastroskop. Diese macht eine Operation erforderlich. Die Entnahme einer Gewebeprobe führt, soweit nicht eine besondere Blutungsneigung besteht, lediglich zu einer unbedeutenden, sehr geringen Blutung. Überempfindlichkeitsreaktionen auf die Beruhigungsspritze sind sehr selten. Um das Risiko einer Komplikation so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie folgende Fragen zu beantworten:

**Besteht bei Ihnen eine vermehrte Blutungsneigung bzw. eine Störung der Blutgerinnung?**

- Nein  Ja

**Nehmen Sie Falithrom®, Marcumar®, Coumadin®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Brilique®, Lixiana® ein?**

- Nein  Ja, \_\_\_\_\_

Wenn ja, bitte folgende blutverdünnende Medikamente wie folgt Absetzen:

<b>ASS, Clopidogrel, Godamed:</b> weiter einnehmen wie bisher
<b>Xarelto, Pradaxa, Lixiana:</b> 48 h vorher Absetzen
<b>Eliquis:</b> 24 h vorher Absetzen
<b>Falithrom und Marcumar:</b> über den Hausarzt den INR Wert bestimmen lassen, dieser sollte unter 2 liegen

**Besteht eine Allergie (Heuschnupfen, Asthma) bzw. eine Überempfindlichkeit gegen Nahrungsmittel, Latex, Medikamente, Pflaster oder örtliche Betäubungsmittel?**

- Nein  Ja, \_\_\_\_\_

**Leiden Sie an einer Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankung?**

- Nein  Ja, \_\_\_\_\_

**Haben Sie einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus?**

- Nein  Ja

**Ist bei Ihnen ein zu hoher Augendruck (grüner Star) bekannt?**

- Nein  Ja

**Ist bei Ihnen eine ernsthafte Infektionskrankheit (AIDS, Hepatitis) bekannt?**

- Nein  Ja

**Sind Sie operiert am oberen Verdauungstrakt?**

- Nein  Ja, \_\_\_\_\_

**Name Hausarzt:** \_\_\_\_\_

**Name Gynäkologe oder Urologe:** \_\_\_\_\_

## Nach der Untersuchung

Eine Stunde nach der Magenspiegelung lässt die Wirkung des Rachensprays nach und es ist möglich wieder zu Essen und zu Trinken. Sollten Sie eine Beruhigungsspritze erhalten haben, besteht Fahruntüchtigkeit für den gesamten Tag! In diesem Fall stellen wir Ihnen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Tag der Untersuchung aus. Außerdem benötigen Sie eine Abholperson, die Sie sicher nach Hause begleitet. Wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte, eine Abholperson zu organisieren, werden wir für Sie ein Taxi bestellen. Falls keine Sedierung erfolgt ist, ist das Führen eines Fahrzeuges jeder Zeit möglich.

## Erklärung des Patienten nach dem Aufklärungsgespräch

Herr Dr. med. Mentel /Herr Dipl.-med. Henke hat mit mir anhand der Hinweise im Bogen ein Aufklärungsgespräch geführt, bei dem ich alle mich interessierenden Fragen stellen konnte.

- Ich habe keine weiteren Fragen, willige nach reiflicher Überlegung in die Untersuchung ein und gebe mein Einverständnis, dass meine Abholperson über das Untersuchungsergebnis informiert wird. Notwendige Neben- oder Folgeeingriffe finden meine Zustimmung.

ODER

- Ich lehne die Untersuchung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung wurde ich informiert.

Heidenau, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Patientenunterschrift/Sorgeberechtigter

\_\_\_\_\_  
Herr Dr. med. Dan-Christian Mentel  
Herr Dipl.-med. Gottfried Henke

## Abholperson:

Wir möchten Sie bitten, nachfolgend den Namen Ihrer Abholperson einzutragen:

Frau/Herr \_\_\_\_\_  
wird mich wohlbehalten bis zur Wohnungstür geleiten.

**Nach** der Untersuchung bitten wir um Unterschrift der

ABHOLPERSON: \_\_\_\_\_